

# Bron en contactonderzoek (BCO)

## Bij 1 positief getest kind/medewerker

De GGD en kinderopvang nemen contact met elkaar op en stellen de dagen vast waarvoor het contactonderzoek geldt, afhankelijk van de aanwezigheid van de besmette persoon op kinderopvang (besmettelijke periode: 2 dagen voor de eerste ziektedag). De kinderopvang maakt een lijst van de aanwezige personen, met wie de besmette persoon in nauw contact is geweest (categorie 2). Dit is afhankelijk van de maatregelen die op dat moment in de groep en op school werden toegepast:

- de kinderen die in dezelfde groep op dezelfde dag waren ingedeeld;
- de medewerkers die op de groep op dezelfde dagen werkzaam waren;
- externe contacten binnen de kinderopvang die in de besmettelijke periode nauw contact hadden, bijvoorbeeld halen van kinderen in een busje of stagiaires.
- Ook kan het zijn dat een medeleerling een nauw contact is vanwege buitenschoolscontact, maar niet vanwege het contact op school.

De andere contacten die meer dan 15 minuten in dezelfde ruimte waren als de besmettelijke persoon, worden beschouwd als categorie 3-contact. Zij worden bevraagd of ze klachten hebben. Afhankelijk van de context wordt alleen de groep of worden meerdere groepen bevraagd.

### Maatregelen

Alle contacten die zijn geïdentificeerd als categorie 2-contact van de persoon met COVID-19 krijgen een quarantaineadvies. Vanaf 5 dagen na de laatste blootstelling kunnen zij zich laten testen met een PCR-test. Bij een negatieve uitslag wordt de quarantaine opgeheven. Overige, niet nauwe contacten (categorie 3) krijgen het advies hun gezondheid te monitoren. De GGD adviseert over eventuele informatieverstrekking aan de ouders.

Indien veel kinderen in de groep waar een besmetting is geconstateerd bij het contactonderzoek als categorie 2-contact worden aangewezen, kan dit tot gevolg hebben dat op indicatie van de GGD/arts infectieziektebestrijding een hele groep thuis moet blijven en gevraagd wordt om te testen op dag 5 (of eerder indien klachten), uit praktische overwegingen en/of op advies van de GGD om doorgaande transmissie te voorkomen. Indien een kind niet getest wordt op of na dag 5 geldt een quarantaine van 10 dagen na het laatste risicocontact.

### Uitbraakonderzoek

Er is sprake van een uitbraak als er binnen de kinderopvang 3 of meer gevallen zijn die gerelateerd lijken te zijn in tijd en plaats. De GGD brengt samen met de kinderopvang in kaart of er sprake is van een cluster of uitbraak en of er (mogelijk) verspreiding heeft plaatsgevonden binnen de kinderopvang. Hiervoor doet de GGD epidemiologisch uitbraakonderzoek. Praktisch gezien betekent bovenstaande het volgende:

- Onder leiding van de GGD IJsselland wordt een uitbraakonderzoek uitgevoerd om de situatie in kaart te brengen.

- De GGD inventariseert de samenhang in tijd en groep van de gemelde gevallen.
- De GGD doet, in samenwerking met de houder het BCO rondom de positieve medewerkers en/of kinderen in de kinderopvang. De GGD en de kinderopvang nemen contact met elkaar op en stellen de dagen vast waarvoor het contactonderzoek geldt. Dit is afhankelijk van de aanwezigheid van de besmette personen op de kinderopvang (besmettelijke periode: 2 dagen voor de 1e ziektedag). De kinderopvang maakt een lijst van de aanwezige personen met wie de besmette personen in nauw contact zijn geweest.
- Afhankelijk van de context wordt alleen de groep of worden meerdere groepen bevraagd.
- De GGD adviseert over eventuele informatieverstrekking aan de ouders.

## Maatregelen

Alle contacten die zijn geïdentificeerd als categorie 2-contact van de personen met COVID-19 krijgen een quarantaineadvies. Vanaf 5 dagen na de laatste blootstelling kunnen zij zich laten testen met een PCR-test. Bij een negatieve uitslag wordt de quarantaine opgeheven. Overige, niet nauwe contacten (categorie 3) krijgen het advies hun gezondheid te monitoren. Zie ook het [BCO-protocol](#) voor definitie van contacten en de maatregelen. De GGD adviseert over eventuele informatieverstrekking aan de ouders.

Indien de GGD op basis van epidemiologisch uitbraakonderzoek heeft vastgesteld dat er sprake is van een cluster of uitbraak waarbij verspreiding heeft plaatsgevonden op de kinderopvang (meerdere besmettingen verspreid over een groep, of over de kinderopvang) bepaalt de GGD samen met de kinderopvang welke maatregelen genomen kunnen worden om verdere verspreiding te voorkomen.

- Denk hierbij aan beter handhaven van algemene maatregelen of quarantaine voor kinderen en medewerkers die een verhoogd risico gelopen hebben op besmetting en/of grootschalig testen om sluiting van de kinderopvang te voorkomen.
- Bij **meerdere groepen waar 1 besmetting** is geconstateerd en waarbij meerdere kinderen bij het contactonderzoek als categorie 2-contact worden aangewezen, heeft dit tot gevolg dat meerdere groepen thuis moeten blijven en getest worden op dag 5 (of eerder indien klachten), uit praktische overwegingen en/of op advies van de GGD om doorgaande transmissie te voorkomen.
- Bij **meerdere besmettingen (>1) in 1 groep** wordt geadviseerd dat hele groep in quarantaine gaat en getest kan worden op dag 5 (of eerder indien klachten).
- Bij een cluster of grote uitbraak met **gerelateerde besmettingen verspreid over meerdere groepen**, kan meer uitgebreide quarantaine voor de (gehele) kinderopvang geadviseerd worden.
- Zie ook hierna onder Testbeleid

## Testbeleid

Bij een uitbraak kan het zinvol zijn om meer kinderen en/of personeelsleden (met of zonder klachten) te testen om hierdoor beter zicht op te krijgen op de uitbraak. Bijvoorbeeld alle groepen met één of meer indexen, of de hele kinderopvang bij een grote en snelle verspreiding over de kinderopvang